

Gliederung

- 1. Leber-Galle und Stoffwechsel
- 2. Magen-Darm und Verdauung
- 3. Pankreas
- 4. Psyche und Nervensystem
- 5. Bewegungsappart

2





1.Leber-Galle undStoffwechsel

1. Leber-Galle und Stoffwechsel









10 g (= 10,5 ml) metaheptachol®N enthalten:

Berberis Dil. D2 1,0 g Carduus marianus Ø 0,1 g Chelidonium Dil. D6 1,0 g Flor de piedra Dil. D6 0,3 g Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D2 1,0 g Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g

1 Ampulle (2 ml) enthält:

Berberis vulgaris Dil. D3 200 mg Carduus marianus Dil. D3 200 mg Chelidonium Dil. D3 200 mg Fel tauri depuratum Dil. D3 100 mg Flor de piedra Dil. D3 100 mg Phosphorus Dil. D12 100 mg Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D4 200 mg Stannum metallicum Dil. D12 100 mg

1. Leber-Galle und Stoffwechsel

Mögliche Praxisindikationen:

- Unterstützung des Leber-Galle-Stoffwechsels
- zur Anregung des Gallenflusses bei Verdauungsstörungen
- zur unterstützenden Drainage-Therapie bei einer Entgiftungs- und Ausleitungstherapie zur besseren Drainage lipophiler Toxine

Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.

1. Leber-Galle und Stoffwechsel







10 g (= 10,4 ml) metamarianum B12 N enthalten:

Absinthium Dil. D1 0,2 g Agrimonia eupatoria ex herba rec. Dil. D2 (HAB, Vorschrift 3a) 0,5 g Berberis Dil. D2 1,0 g Carduus marianus Ø 0,1 g Chelidonium Dil. D6 1,0 g Cyanocobalaminum Dil. D3 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit ger. Wasser) 0,02 g Flor de piedra Dil. D6 0,3 g Magnesium sulfuricum Dil. D2 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit ger. Wasser) 3,0 g Quassia amara Dil. D2 1,0 g Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g

hepat

1. Leber-Galle und Stoffwechsel

Mögliche Praxisindikationen:

- Unterstützung des Leber-Galle-Stoffwechsels
- zur unterstützenden Behandlung einer Leberinsuffizienz
- beim "Schmerz" der Leber, der Müdigkeit! (auch beim Burn-out-Syndrom)
- auch bei "Frühjahrsmüdigkeit", auch dann in Kombination mit den metahepat Amp.

Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.



2.
Magen-Darm
und
Verdauung











10 g (= 10,4 ml) metanuxvomica enthalten:
Absinthium Dil. D1 0,20 g
Argentum nitricum Dil. D5 3,00 g
Basilicum, Herba Dil. D1 0,20 g
Belladonna Dil. D4 2,00 g
Mandragora e radice siccata Dil. D6 1,00 g
Nux vomica Dil. D4 2,00 g

2. Magen-Darm und Verdauung

Mögliche Praxisindikationen:

 als Parasympatholytikum (Spasmolytikum) bei Krämpfen der glatten Muskulatur der Verdauungsorgane, auch durchaus in Kombination mit den metaharonga Tr. und/oder metaheptachol N Tr. und metahepat Amp.

Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.

10





3. Pankreas

Mögliche Praxisindikationen:

- bei exkretorischer Pankreasinsuffizienz mit Beschwerden wie Völle- und Druckgefühl im Oberbauch, Meteorismus, Anorexie sowie Intoleranz gegen süße, schwer verdauliche und fettreiche Kost
- bei Gärungs- und Fäulnisdyspepsie
- zur Ausleitungstherapie bei Belastungen der Pankreas als Toxinfänger
- als Adjuvans bei Diabetes mellitus Typ II

Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.

Piper methysticum

4.
Psyche
und
Nervensystem

14

4. Psyche und Nervensystem





10 g (= 10,6 ml) metakavernit enthalten: Argentum nitricum Dil. D5 3,0 g Mandragora e rad. sicc. Dil. D6 1,0 g Piper methysticum e rad. sicc. Dil. D6 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] 1,0 g Sumbulus moschatus e rad. sicc. Dil. D4 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] 1,0 g







In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet: Argentum nitricum Dil. D5 30,0 mg Sumbulus moschatus (HAB 34) Dil. D2 (HAB, Vorschrift 4a) 20,0 mg Mandragora e radice siccata Dil. D6 10,0 mg Piper methysticum e radice siccata Dil. D2 (HAB, Vorschrift 4a) 10,0 mg


4. Psyche und Nervensystem

Mögliche Praxisindikationen:

bei Angststörungen z.B. Flug,- Prüfungs- oder MRT-Angst

Dosierungsempfehlung metakavernit Tr.: 3 x tgl. 30 Tr.

Dosierungsempfehlung metakaveron Glb.: 3 x tgl. 10 Glb.



5. Bewegungsapparat

...



5. Bewegungsapparat

Mögliche Praxisindikationen:

- zur Schmerzreduktion bei jeglichen weichteilrheumatischen Beschwerden
- auch zur unterstützenden Behandlung der Fibromyalgie

Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.

5. Bewegungsapparat 50 ml Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates Die Wirkstoffe sind: 10 g (= 10,3 ml) metaossylen N enthalten: Ferrum sesquichloratum solutum 0,5 g 1,7 g Bryonia Dil. D2 Eisen-III-chlorid-Lösung

Ferrum sesquichloratum solutum Dil. D2

5. Bewegungsapparat

Mögliche Praxisindikationen:

 zur Schmerzreduktion bei akutem und chronischem Rheumatismus (z.B. Schulterschmerzen, Schulter-Arm-Syndrom)

Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.



5. Bewegungsapparat

Mögliche Praxisindikationen:

• bei traumatischen Beschwerden am Bewegungsapparat


Dosierungsempfehlung: 3 x tgl. 30 Tr.

Pflanzenbildernachweis:

Folien: alle anderen Dr. Ploss

Folie: 12,14,15,20 Fa. metafackler





Für die Anforderung des Vortrags als pdf, einem Musteranforderungsformular oder sonstigen weiterführenden Infomaterialien kontaktieren Sie bitte die meta Fackler Arzneimittel GmbH unter der Mailadresse

webinar@metafackler.de mit Angabe des Webinardatums.

Gegebenenfalls können Sie auch unter der Rufnummer 05041-944010 die med.-wiss.-Abteilung erreichen

2

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Referent:

Naturheilpraxis Ibbenbüren

Dr. rer. nat. Oliver Ploss,

Heilpraktiker und zertifizierter Apotheker /Homöopathie und Naturheilverfahren

